

HOBOKEN RADIOLOGY

Providing a clearer image of health



PET/CT • Low Dose CT • 3D/4D Ultrasound • X-Ray • Bone Densitometry
79 Hudson Street, Suite 100 • Hoboken, NJ 07030 • Tel 201-222-2500 • Fax 201-469-0555
www.HobokenRadiology.com

PATIENT INSTRUCTIONS: ULTRASOUND

Obstetrical.

8 - 14 weeks	Drink 40 oz of water half hour before exam.
15 - 30 weeks	Drink 24 oz of water half hour before exam.
30 weeks & above	Drink 8 oz of water half hour before exam.

Pelvis, Renal & Urinary Bladder.

Drink 40 oz of water half hour before exam

DO NOT URINATE UNTIL COMPLETION OF EXAM

Abdomen, Gallbladder, Pancreas, Spleen, Liver & Aorta.

Fasting from midnight or eight hours before. May take small amount of water with medication

Sonohysterogram

If you are pregnant or think you are pregnant, this procedure cannot be done at this time.
Exam must be done 7-12 days from the start of menstrual cycle. No intercourse and no douching on day of exam.
Eat light meals. To lessen menstrual cramping take 400-800 mg of Ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin) 1 to 2 hours prior to exam. Inform us of any allergies, especially latex.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE: ULTRASONIDO

Obstetrica.

8 - 14 semanas	Beber 40 oz de agua media hora antes del examen.
15 - 30 semanas	Beber 24 oz de agua media hora antes del examen.
30 semanas y mas	Beber 8 oz de agua media hora antes del examen.

Pelvis, Renal & Vejiga Urinaria.

Beber 40 oz de agua media hora antes del examen.

NO SE DEBE ORINAR HASTA LA FINALIZACION DEL EXAMEN

Abdomen, Vesicula Biliar, Páncreas, Bazo, Hígado y Aorta.

En ayuna desde la media noche u ocho horas antes. Puede tomar una pequena cantida de agua con su medicamentos.

Sonohisterograma

Si usted esta embarazada o cree que esta embarazada, este procedimiento no se puede hacer en este momento.
Examen debe hacerse 7-12 dias desde el comienzo del ciclo menstrual. No relaciones sexuales o duchas vaginales en el dia del examen. Comer comidas ligeras. Para reducir retorcojones del ciclo menstrual tomar 400-800 mg de Ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin) 1 a 2 horas antes del examen. Informar al personal de cualquier alergia, en especial de látex.